

Betegfelvilágosító – tájékoztató – beleegyező nyilatkozat

TOKAMŰTÉT (Submentalis lipectomia)

Tisztelt Hölgem/ Uram!

Köszönjük, hogy Intézetünket tisztelte meg bizalmával. Érdeklődésére a tokaműtétről a következő tudnivalókat közöljük Önnel:

A toka az áll alatt elhelyezkedő, zsírlerakódás következtében kialakuló kontúrtöbblet. Lehet alkati tulajdonság, képződhet hízás, testsúlygyarapodás kapcsán, valamint kialakulhat a nyak bőrének megereszkedése következtében is. A toka eltávolítására két lehetőség van. **1.** Zsír szívás: fiatal, rugalmas bőrű egyéneknél, nem túl nagy mennyiségű zsír esetén. **2.** Amennyiben az 1. pontban leírtaknak nem felel meg a páciens, úgy metszéssel távolítjuk el a toka zsírfelületét.

A műtét az áll alatti redőben ejtett metszéssel át történik. Eltávolításra kerül az itt elhelyezkedő bőr alatti zsírfelület. Szükség esetén a toka egyik vagy mindkét oldalán hosszanti redőt alkotó, petyhüdt bőr alatti nyakizmot meg kell feszíteni, közepén összevarrni. Ezáltal a nyak-áll szöglet kívánatos mélységűvé válik, a redő megszűnik. Természetesen a zsír eltávolítása következtében keletkező relatív bőrfelület is el kell távolítani. Nagy bőrfelülettel ezzel a műtéttel nem távolítható el! Nagy bőrfelület illetve a bőr petyhüdsége esetén a toka eltávolítását az arc és nyak bőrének felvarrásával kell kombinálni.

A bőrsébet a bőr alatt illetve a bőrben vezetett kívülről nem látható, tova futó varratokkal egyesítjük, majd a műtét végén rugalmas nyomó kötés biztosítja, hogy a műtési terület ne vérezzen be.

A műtétet helyi érzéstelenítésben végezzük. A műtét - az érzéstelenítés néhány tűszúrásnyi kellemetlenségén kívül – fájdalommentes.

Szövődmények: A műtétnek a minden műtét során ritkán (3-5%) előforduló szövődményein (bevérzés, vérömleny, savógyülem, fertőzés) túl egyéb kockázata nincs. Nagyon ritkán előfordulhat, hogy a műtét helyén a nyomó kötés ellenére vérömleny keletkezik vagy véres savó gyűlik meg. Ilyenkor azt injekciós tűvel lebocsátjuk, ez nem veszélyeztet a műtét eredményét, csupán a gyógyulási folyamat húzódik el.

Műtét után a műtési területen a bőr gyakran elszíneződik a szövetközi vérszivárgás miatt. Ennek felszívódási ideje egyénekenként változó, maximum 2-3 hét.

A műtési területen illetve annak környékén lefutó idegszálak meghúzódása, sérülése vagy átvágása érzészavart, érzéskiesést vagy a vártnál erősebb fájdalomérzést eredményezhet a műtési területen illetve annak környékén. Teljes állapotrendeződés hetek, hónapok alatt várható.

A műtési heg – az egyéni hegesedési hajlamtól függően változó, de - általában vékony, az áll alatt egyébként is meglévő redőben helyezkedik el, gyakorlatilag nem észrevehető. Mivel az emberi test sem teljesen szimmetrikus, nem várható, hogy a műtét után kialakuló forma, a bőr feszessége, a műtési heg minősége és helyzete teljesen szimmetrikus legyen.

Fentieket áttanulmányoztam, az abban foglaltakat -- valamint a részletes orvosi felvilágosítás során nyert további információkat - tudomásul vettem. Minden további kérdésemre kielégítő felvilágosítást kaptam.

Mindezek tudatában a tokaműtét elvégzését kérem, a műtét fent leírt kockázatait vállalom, ezzel kapcsolatban a későbbiekben panaszt nem emelek.

Budapest, 20... .. hónap.

Páciens aláírása:.....

Születési dátum:.....

Lakcíme, telefonszáma.....

.....

Tanú-1.

Neve:

Lakcíme:.....

.....

Tanú-2.

Neve:

Lakcíme:.....

.....