

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	BETEGTÁJÉKOZTATÓ KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI OSZTÁLY	FNY1028/12-2020.06.08. Változat: 3
Tárgy: Betegtájékoztató termoablációs daganatroncsoláshoz		Oldalszám: 1/1

BETEGTÁJÉKOZTATÓ TERMOABLÁCIÓS DAGANATRONCSOLÁSHOZ

Tájékoztató:

Jelen betegtájékoztató elolvasásával és a beavatkozást végző orvos személyes, szóbeli tájékoztatásával felvilágosítást kaptam arról, hogy nálam kezelőorvosaim (legtöbbször az onkoteam, vagy onkológus és intervenció radiológus) szakmai konzíliuma és egyetértése alapján percután, lokális daganatterápiára van szükség és lehetőség.

Az Ön esetében a percután termoablációs daganatroncsolást tartják kezelőorvosai a legmegfelelőbb helyi, daganatroncsoló eljárásnak.

Ennek során a daganatba képző eljárás vezérlése mellett egy tűt bevezetve, mód van a daganat szövetének helyi felmelegítésére. A beavatkozás során igyekszünk 10-12 percig legalább 60-80 Celsius fokra melegíteni a daganatszövetet, ami ettől elpusztul.

Ezzel a módszerrel szervtől, a daganat elhelyezkedéstől és a használt tű típusától függően 3-4 cm átmérőjű daganat roncsolható egy ülésben.

A beavatkozás általában helyi érzéstelenítéssel és/vagy aneszteziológus által kontrollált bódításban végezzük.

A lehetséges szövődmények között a vérzés, a késői tályogképződés illetve a szomszédos szervek, struktúrák hőterheléses sérülése szerepelhet. Ezen szövődmények súlyos, utókezelést kikényszerítő formái 0.5-1.6 %-ban fordulnak elő a kellő gyakorlatú onkointervenció centrumokban.

A betegtájékoztató érvényességi ideje: a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább két évente felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható (MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).