

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉRSEBÉSZETI PROFIL	FNY1012/4-2020.11.23.
Tárgy: Betegtájékoztató a comb és a térdhajlat verőérének tágulatakor végzett beavatkozásokhoz (aneurizma rezekció)		Változat: 2 Oldalszám: 1/2

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A COMB ÉS A TÉRDHAJLAT VERŐERÉNEK TÁGULATAKOR VÉGZETT BEAVATKOZÁSOKHOZ (ANEURIZMA REZEKCIÓ)

Tisztelt Betegünk!

Az eddigi vizsgálatok segítségével megállapítottuk, hogy az Ön combjában és/vagy térdhajlatában futó verőér ki van tágulva. Ez a tágulat olyan mértékű, hogy beavatkozás nélkül fennáll a veszélye annak, hogy véralvadék képződik benne, amit a véráram váratlanul a láb kisebb ereibe sodorhat, és ott a véralvadék érelzáródást okozhat. Ennek megelőzésére a tágult érszakaszt műtét útján egy másik érre kell cserélni. A tervezett beavatkozás előtt beszélni fogunk Önnel a műtétről. Ismernie kell azokat a hasznos következményeket, amelyeket a műtét eredményez, azokat a káros következményeket, amelyeket annak elmaradása okozhat, valamint azokat a lehetséges szövődményeket, melyekkel a műtét járhat, hogy felelősséggel beleegyezhesen annak elvégzésébe. Ez a tájékoztató segítséget nyújt, hogy fel tudjon készülni a beavatkozás előtti megbeszélésre.

Mi okozhatja a verőér tágulatát?

Az Önnél fennálló értágulat nagy valószínűséggel érelmeszesedés következménye, mely gyakrabban jelentkezik dohányosoknál, cukorbetegyeknél, magas vérnyomású egyéneknél és olyanoknál, akiknek a vérsír-szintje magas.


Miért veszélyes ez a betegség, és milyen kezelési lehetőségeink vannak?

A tágult érszakaszban általában véralvadék, vérrög képződik. A véráram ezt a vérrögöt a láb kisebb verőereibe sodorhatja, amit a vérrög így elzár. Az így kialakuló hirtelen verőér-elzáródás (*embólia*) miatt a láb oxigén- és tápanyagellátása romlik. Az elsodródott vérrögöt néhány órán belül műtét útján el kell távolítani. Ellenkező esetben a lábban erős fájdalom jelentkezik, a láb kihűl és később elhalhat. A tágult verőérszakasz megrepedhet, ami rövid időn belül nagy mennyiségű vérvesztést és így életveszélyes állapotot okoz. A verőértágulatot gyógyszerekkel vagy műtéttel lehet kezelni. Az Ön esetében a műtétet javasoljuk.


Hogyan végezzük a műtétet?

A beavatkozást alátásban vagy az alsó testfélre kiterjedő érzéstelenítésben végezzük. A kitágult verő érszakaszt egy, a combjából vett vénával vagy műérrel megkerüljük, a tágulatot pedig lekötjük, így kiiktatjuk a keringésből. Amennyiben saját vénát használunk a megkerülésre, segédmetszéseket kell ejtenünk a comb belső oldalán ott, ahonnan a vénát nyerjük. Műeret akkor használunk, ha a saját éret nem lehet felhasználni.

Elképzelhető, hogy műtét után érfestéssel (*kontrasztanyag* felhasználásával) ellenőrizzük a műtött területet.



comb verőere
térdhajlat verőérének tágulata



megkerülő ér

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉRSEBÉSZETI PROFIL	FNY1012/4-2020.11.23. Változat: 2
Tárgy: Betegtájékoztató a comb és a térdhajlat verőérének tágulatakor végzett beavatkozásokhoz (aneurizma rezekció)		Oldalszám: 2/2

Milyen szövődmények lehetségesek?

Az orvosi beavatkozások szövődménymentességét nem lehet garantálni. Amennyiben az értágulatot még az embólia kialakulása vagy annak megprepedése előtt megszüntetjük, a szövődmények kialakulásának veszélye csekély.

Ehelyütt a legfontosabb szövődménylehetőségeket soroljuk fel:

- Ma már ritkán fordulnak elő fertőzések, *trombózis* (véralvadék képződése az érben), illetve embólia (a verőeret tovasodródó véralvadék zárja el). Ezen szövődmények megelőzésére és kezelésére sokkal többet tudunk tenni, mint korábban.
Előfordulhatnak utóvérzések a láb verőérének vagy a megkerülő ér elzáródása, melyeket általában ismételt műtéttel lehet kezelni. Nagyon ritka, hogy a kialakult szövődmények a láb elvesztéséhez vezetnének, esélyét viszont növeli, ha a műtétet a lábszár ereinek elzáródása után végezzük el.
- Minthogy a kitágult ér közelében idegek és más erek is futnak, ezek sérülését nem tudjuk teljes mértékben kizárni.
- Az esetleges érfestéshez használt kontrasztanyagot az emberi szervezet általában jól tűri. Túlérzékenység (allergia) esetén hányinger, viszketés, bőrkiütések és hasonló enyhe reakciók jelentkezhetnek, melyek rendszerint maguktól elmúlnak. Súlyos allergiás reakciók, melyek a keringési-, légzési rendszer, illetve a vesék vagy az idegrendszer károsításával kórházi ellátást tehetnek szükségessé, és maradandó károsodáshoz vezethetnek, nagyon ritkák.

Milyenek a kilátások a jó eredményre?

A műtét eredménye akkor lesz tartós, ha sikerül megszüntetni azokat az okokat, ami miatt az értágulat kialakult. Ehhez Ön tud leginkább hozzájárulni, ezért:

- ha dohányzik, hagyja abba a dohányzást;
- sétáljon minden nap;
- a felírt gyógyszereket vegye be! Ezek segítenek megakadályozni, hogy újabb károsodott érszakaszok alakuljanak ki, illetve egyidejűleg védik a műtött eret. Amennyiben a gyógyszerek kellemetlen mellékhatásait érzi, beszéljen családjával!

Egy újabb értágulat kialakulásának megelőzése az Ön részéről némi odafigyelést kíván. Beszéljen családjával arról, hogy mit kell tennie ennek érdekében, és kövesse tanácsait! Kérjük, beszéljen családjával arról is, hogy hogyan küszöbölheti ki az érelmeszesedésre hajlamosító egyéb kockázati tényezőket (pl. magas vérnyomás, magas vérzsír-szint).

A betegtájékoztató érvényességi ideje: a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább két évente felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható (MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).